

Réintroduction de *Scarabaeus laticollis* sur la RNN de l'étang de Cousseau



Rappel du contexte

- Un contexte favorable et une très forte diversité pour ce groupe sur la RNN
- 29 espèces identifiées en 2022
- Quatre espèces patrimoniales pour la Gironde dont *Chilothonax cervorum* (RRR)
- Des interactions multiples pour la biodiversité



Des espèces rares ou disparues

- Trois espèces identifiées en amont du projet :

Scarabaeus laticollis

Disparu (dernière donnée connue
1960 – Montalivet)



Scarabaeus typhon

Disparu



Thorectes sericeus

Toujours présent mais rare et localisé




Des espèces rares ou disparues

➤ Quel choix ? :


Scarabaeus typhon
Disparu




En forte régression dans
le sud de la France
Impact négatif d'un
éventuel prélèvement



Thorectes sericeus
Toujours présent mais
rare et localisé



Impossibilité de recréer
des milieux propices dans
l'immédiat
Espèce aptère



Abandon à ce
stade du projet




Des espèces rares ou disparues


➤ Quel choix ? :

*Scarabaeus
laticollis*

Disparu (dernière donnée
connue 1960 – Montalivet)




Un contexte sanitaire et
des milieux favorables sur
la RNN



Choix de l'espèce
favorable (validé
en CSRPN du
27/09/22)




Espèce encore abondante
dans le sud de la France



Choix final

- Choix final : *Scarabaeus laticollis*
- Un telecopride (groupe quasi inexistant en Gironde)
- Espèce non réglementée
- Répartition actuelle : méridionale



Le projet



2023	2024	2025
20-30 couples	20-30 couples	?
Suivi scientifique	Suivi scientifique	Suivi scientifique

Première phase – printemps 2023

- Piégeage à proximité de Montpellier pendant une dizaine de jours (J-P Lumaret)
- Récolte de 63 individus au 20 04 2023



Première phase – printemps 2023

- Relâcher des 63 individus en deux étapes : 40 individus le 21 04 2023 et 23 individus le 26 04 2023



Le suivi en cours

- CMR Capture Marquage Recapture
- Recherche à vue
- Suivi par piégeage passif
- Marquage des zones potentielles de ponte




Des premiers résultats encourageants

- Les néo-girondins déjà à l'œuvre
- Une seconde émergence attendue en juillet-août 2023?




Pourquoi réintroduire cette espèce disparue?

- Restaurer le bon fonctionnement des écosystèmes en lien avec le troupeau de vaches marines landaises




Pourquoi réintroduire cette espèce disparue?

- A l'heure de la 6eme extinction de la biodiversité : Enrayer les espèces en déclin ou disparues



Pourquoi réintroduire cette espèce disparue?

- Poursuivre une démarche de conservation du pâturage naturel et favoriser les chaînes alimentaires



Pourquoi réintroduire cette espèce disparue?

- Être pionniers dans les démarches de restauration et de conservation des espèces – une première nationale !



Pourquoi réintroduire cette espèce disparue?

- Communiquer et sensibiliser sur les espèces moins connues du grand public

Print subscriptions Sign in Search jobs Search International edition

Support the Guardian
Fund independent journalism with €5 per month
Support us →

The Guardian

News Opinion Sport Culture Lifestyle More

World Europe US Americas Asia Australia Middle East Africa Inequality Global development

The age of extinction
Rewilding

This article is more than 1 month old

Field of fresh cow pats welcomes first dung beetles to be rewilded in France

The age of extinction is supported by
the guardian.org

About this content
Patrick Greenfield
@pgreenfielduk
Sun 30 Apr 2023 13:00 BST



SCIENCES ET ENVIRONNEMENT • FRANCE • BIODIVERSITÉ

Réensauvagement. “L’histoire de France est en marche” : des bousiers sont réintroduits en Gascogne

Dans le cadre d’un projet européen, des coléoptères mangeurs d’excréments de bovins, ont été relâchés le 26 avril dans la réserve de l’étang de Cousseau. “The Guardian” raconte comment cette région retrouve peu à peu l’écosystème qui prévalait avant la plantation de pinèdes sous Napoléon III.

SOURCE: **Courrier international** Réservé aux abonnés Publié le

Médoc : le bousier réintroduit dans la réserve de Cousseau cinquante ans après sa disparition

Lecture 1 min
Accueil • Gironde • Carcans

